



ONE

Fütterungssystem mit Tränkeeimern Neugeborene Kälber

Milkivit ONE sollte den Kälbern möglichst bald nach der Kolostrumphase verabreicht werden.

Mischen Sie Milkivit ONE mit einer Konzentration von 135 g/l und bei einer Temperatur von 42°C an, sodass die Verfütterung bei 38 bis 40°C erfolgt. Die Fütterungshäufigkeit ist auf mindestens zweimal pro Tag anzusetzen.

Alter	Kolostrum pro Tag	Kolostrumphase
Tag 1	6 L	4 Liter sauberes Kolostrum mit hohem Antikörpergehalt in den ersten 4 Stunden nach der Geburt; anschließend weitere 2 Liter in den ersten 12 Stunden nach der Geburt.
Tag 2	6 - 8 L	Kolostrum ODER Transitmilch/Milkivit ONE*
Tag 3	6 - 8 L	Kolostrum ODER Transitmilch/Milkivit ONE*

Alter	Milkivit ONE pro Tag	Fütterungsphase	Sonstige Futtermittel
Tag 4 - 7	6 - 8 L	Menge je nach Appetit erhöhen	<p>Kraffutter: Nach der Kolostrumphase sollte täglich ein geeignetes Kraffutter angeboten werden, wobei jegliche Futterrestmengen zu entfernen sind</p> <p>Grundfutter: Nach der Kolostrumphase sollten hochwertige Strohhäcksel angeboten werden</p> <p>Wasser: Die Tiere müssen jederzeit Zugang zu frischem, sauberem Wasser haben</p>
Woche 2	8 - 10 L		
Woche 3	8 - 10 L		
Woche 4	8 - 10 L	Spitze der Futterkurve – möglichst nahe am Bedarf füttern	
Woche 5	8 - 10 L		
Woche 6	8 - 10 L		
Woche 7	8 - 10 L		
Woche 8	8 - 10 L		
Woche 9	8 L	Absetzzeit	
Woche 10	6 L		
Woche 11	4 L		
Woche 12	2 L		



***WICHTIG:** Bitte lesen Sie die weiterführenden Fütterungsempfehlungen und Hinweise zur Kolostrum- und Absetzphase auf der Rückseite dieser Broschüre.



Fütterungssystem mit Tränkeeimern Über 48 Stunden alte Kälber

Beim Anfüttern älterer Kälber (die über 48 Stunden alt sind und andere Milch statt Kolostrum erhalten haben) mit Milkivit ONE sollte die folgende 3-tägige Übergangsphase in Betracht gezogen werden:

Übergangsphase	Fütterungsempfehlungen
Tag 1	50 % Transitmilch/Vollmilch mischen mit 50 % Milkivit ONE Beispiel: 2 l Transitmilch + 2 l angemischtes Milkivit ONE (135 g/l)
Tag 2	25 % Transitmilch/Vollmilch mischen mit 75 % Milkivit ONE Beispiel: 1 l Transitmilch + 3 l angemischtes Milkivit ONE (135 g/l)
Tag 3	Transitmilch/Vollmilch aus dem Fütterungsplan nehmen. Nur Milkivit ONE verfüttern
Tag 4 - 7	Ab jetzt alle Empfehlungen auf der Vorseite ab Tag 4 bis 7 weiterführen.

Hinweise zur Kolostrumphase:

- **Kolostralmilch** ist die erste Milch, die von der Mutterkuh nach dem Kalben erzeugt wird.
- Die Kolostrumqualität sollte mit einem Refraktometer ermittelt werden. Regelmäßige Tests und Vergleiche der passiven Immunisierung gewährleisten, dass die betriebseigenen Kolostrumprotokolle erfolgreich verlaufen.
- **Transitmilch** ist die Milch, die beim zweiten bis vierten Melkvorgang nach dem Kalben ermolken wird.
- Wenn eine Fütterung mit Transitmilch nicht möglich ist (aufgrund von Verfügbarkeit, Erkrankung des Muttertieres oder Fütterungslogistik), sollte nach der Kolostrumphase direkt auf Milkivit ONE umgestellt werden. Klären Sie Fragen zur Tiergesundheit bitte mit dem Tierarzt.

Hinweise zur Absetzperiode:

- Das Absetzen sollte über einen Zeitraum von 4 Wochen erfolgen.
- Das Kalb sollte vor dem endgültigen Absetzen an drei aufeinander folgenden Tagen täglich mindestens 2,5 kg Kraffutter aufnehmen.
- Andere Veränderungen wie Gruppen- oder Futterwechsel sind zum Absetzzeitpunkt zu vermeiden, um den Stress zu reduzieren.
- Bei weniger gut entwickelten Kälbern sollte die Milchfütterung weitere 1 bis 2 Wochen fortgesetzt werden.